

## Причины речевых нарушений

- 1. Неблагоприятная наследственность и неправильный образ жизни будущих родителей:
- профессиональные «вредности»,
- наркомания,
- алкоголизм и курение,
- аборты.
- 2. Неблагоприятные факторы, влияющие на будущую речь ребенка во время беременности:
- токсикозы беременности,
- острые и хронические заболевания матери во время беременности (грипп, краснуха, почечная и сердечная недостаточность и др.),
- резус конфликт,
- падения и ушибы матери во время беременности,
- курение и алкоголизм непосредственно в период беременности,
- стрессовые ситуации, связанные с распадом семьи, смертью близких родственников и др.,
- осложнения при родах.
- 3. Неблагоприятные обстоятельства в период раннего развития:
- травмы головы, сотрясения и ушибы головного мозга,
- воспалительные заболевания головного мозга (менингит),
- не долеченные воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха, приводящие к снижению или даже полной утрате слуха,
- приобретенные до сформирования речи повреждения периферического отдела речевого аппарата (аномалии в строении челюстей и зубов как результат травм),
- наличие дефектов речи у окружающих ребенка людей.

Речевые нарушения чаще возникают у мальчиков, у которых и само появление речи наблюдается в несколько более поздние сроки. Это связано с тем, что у мальчиков позднее, чем у девочек, развивается левое полушарие головного мозга, «ответственное» за речевую функцию.